

Lindude gripi seire metoodika

Seoses sellega, et Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas lindude gripp (peamiselt H5N8) palume teavitada Veterinaar- ja Toiduameti maakonna veterinaarikeskust juhul :

- Kui oled leidnud 5 värsket veelinnu korjust või oled tuvastanud ebatavalise veelindude surevuse orienteeruvalt 100 m ulatuses mererannas
- Kui oled leidnud rohkem kui 10 lähestikku asuvat surnud metslinnu värsket korjust maastikul või metsas

Värsket surnud linnu korjust panna lekkekindlasse kilekotti, markeerida ning anda üle veterinaarimetnikule. Transportimisel tagada temperatuur +2 kuni +4°C.

Suurelt veelinnult või röövlinnult võtta tampooniproov.

Tampooniproovid kohe pärast võtmist jahutada +2 kuni 4°C-ni, paigutades need esimesel võimalusel külmkappi või asetades jääle või külmkehadele.

Kui proovid ei jõua laborisse 48 tunni jooksul, tuleb need kindlasti sügavkülmutada -20°C juures.

Maakonna veterinaarikeskuste kontaktid:

Harjumaa Veterinaarikeskus Tel 6580420
Hiiumaa Veterinaarikeskus Tel 4622030
Ida-Virumaa Veterinaarikeskus Tel 3366774
Jõgevamaa Veterinaarikeskus Tel 7720201
Järvamaa Veterinaarikeskus Tel 3854520
Läänemaa Veterinaarikeskus Tel 4724791
Lääne-Virumaa Veterinaarikeskus Tel 3232050
Lääne-Virumaa Veterinaarikeskus Tel 3232050
Pärnumaa Veterinaarikeskus Tel 4471614
Põlvamaa Veterinaarikeskus Tel 799 4413
Raplamaa Veterinaarikeskus Tel 4892590
Saaremaa Veterinaarikeskus Tel 4531273
Tartumaa Veterinaarikeskus Tel 7401208
Valgamaa Veterinaarikeskus Tel 7666712
Viljandimaa Veterinaarikeskus Tel 4350020
Võrumaa Veterinaarikeskus Tel 7824051

Teavita leiust ka Veterinaar- ja Toiduameti peamaja e-mailil:

peamajastaap@vet.agri.ee

Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev lindude viirushaigus. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju. Lindude gripile on vastuvõtlikud kõik kodu- ja uluklinnud. Nakkusallikaks on haiged või haiguse läbipõdenud

viirusekandjad linnud. Lindude nakatumine toimub seedetrakti või hingamisteede kaudu. Haigete lindude ravi puudub.

Gripiviiruse kandjateks looduses on metslinnud (peamiselt veelinnud), kellelt võivad nakkuse saada kodulinnud, eelkõige koduveelinnud nagu haned ja pardid. Metslindude hulgas levib nakkus valdavalt ilma nähtavate haigustunnusteta, kuid kõrge patogeensusega viirustüved põhjustavad tervisehäireid ka metslindudel.

Praegu Euroopas levinud viirustüvi H5N8 ei ole teadaolevalt inimesele ohtlik. Seni ei ole ECDC (Euroopa haiguste ennetamise ja kontrolli keskus) andmetel inimeste seas registreeritud ühtegi haigusjuhtu. ECDC hinnangul on risk inimeste jaoks väga väike.